

# Nederlandse Benoem Test - NBT

**Auteur:** Lizet van Ewijk

**ISBN handleiding:** 9789036825191

**Meet:** woordvindstoornissen bij patienten met NAH

**Leeftijdsbereik:** volwassenen en ouderen

**Afnameduur:** variabel tussen 5 en 30 minuten

**Toepasbaar in:** logopedische praktijk, revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen

**Kwalificatieniveau:** 1 [meer informatie](#)



## **Doel van de test**

De Nederlandse Benoem Test (NBT) is een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindingsstoornissen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT bestaat uit 92 eenduidige afbeeldingen in kleur, opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie. De test geeft hierdoor ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De afbeeldingen van de NBT zijn zorgvuldig uitgezocht voor de Nederlandse setting. De selectie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordvinding en op de behoeftes en voorkeur van logopedisten en cliënten. De test speelt in op de behoefte aan no-nonsense afbeeldingen geschikt voor volwassenen, met items speciaal geselecteerd voor de Nederlandse taal. De test is tot stand gekomen in samenwerking met logopedisten en cliënten met NAH en een afasie, om zo samen een valide, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument te creëren.

## **Toepassing**

- Screening: signaleert de aanwezigheid van woordvindstoornissen
- Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van woordvindproblemen
- Behandeling: meet de vooruitgang van gegeven therapie.
- Onderzoek: toegevoegde waarde voor Nederlands onderzoek: de NBT is speciaal voor de Nederlandse populatie ontwikkeld.

## **Wat meet de NBT?**

De Nederlandse Benoem Test meet woordvindproblemen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De test is opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd (2 categorieën) en woordfrequentie (3 categorieën) en geeft zo ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De test meet het hele woordvindingstraject.

## **Voor wie?**

De NBT wordt in principe afgenomen door een logopedist of klinisch linguïst, maar ook professionals uit andere disciplines met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen kunnen met de NBT werken. Toelichting van een logopedist of klinisch linguïst is dan raadzaam.

## **Afname en scoring**

De afnameduur varieert tussen de 5 en de 30 minuten, afhankelijk van de ernst van de afasie. De afbeeldingen worden visueel aangeboden. De patient benoemt de afbeelding die hij/zij ziet.

## **Normen**

Om na te gaan of er op basis van de NBT een juiste diagnose kan worden gesteld (predictieve validiteit) zijn de scores van gezonden en afatici met elkaar vergeleken. In de handleiding wordt een optimale cut-off score gegeven die het verschil tussen wel/geen stoornis aangeeft.

## **Materialen**

- NBT- complete set
- NBT- scoreformulieren